



B0322

CARACTERIZAÇÃO HISTOLÓGICA E IMUNOISTOQUÍMICA DO INFILTRADO INFLAMATÓRIO LINFOCITÁRIO E COMPARAÇÃO COM A DOSAGEM DE CITOCINAS DAS RESPOSTAS TH1 E TH2 NO LÍQUEN PLANO ORAL E NA REAÇÃO LIQUENÓIDE

Douglas Cardoso de Siqueira (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Jacks Jorge Junior (Orientador), Faculdade de Odontologia - FOP, UNICAMP

As doenças classificadas como imunologicamente mediadas, tais como o líquen plano oral (LPO) e a reação liquenóide de contato (RL) compõem um grupo amplo e distinto de entidades patológicas que comumente acometem a pele e mucosas, possuem manifestações clínicas orais semelhantes e etiopatogenia relacionada com uma resposta imunológica aumentada. Sendo o objetivo a caracterização clínica, histológica e imunoistoquímica do infiltrado inflamatório e comparação com dosagem sérica de citocinas das respostas Th1 e Th2 no líquen plano oral (LPO) e reação liquenóide. (RL).

Líquen plano oral - Reação líquenóide - Linfócito