



B0204

VALOR DA PESQUISA DA CITOLOGIA ONCÓTICA NO LAVADO PERITONEAL DE PACIENTES PORTADORES DE CÂNCER GÁSTRICO

Suze Aparecida da Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Luiz Roberto Lopes (Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP

O câncer gástrico é um dos tumores malignos mais comuns e mais agressivos. A sintomatologia inicial costuma ser inespecífica, o que dificulta o diagnóstico precoce. A carcinomatose peritoneal, uma disseminação do câncer na cavidade peritoneal, é consequência da metástase do tumor avançado, sendo considerado um estado de doença incurável. Daí a importância de um estadiamento pré-cirúrgico mais sensível, poupando procedimentos invasivos em pacientes com tumor irressecável. O estudo avalia se a citologia oncótica peritoneal positiva é associada à doença avançada e, portanto, se específica na predileção de irressecabilidade do tumor. O objetivo é aumentar a sensibilidade dos testes diagnósticos de tumores gástricos, compatível com os estadiamentos pré-estabelecidos e o anatomopatológico. Para isso, está sendo realizada uma análise comparativa, entre dois métodos analíticos do material biológico (lavado peritoneal) coletado dos pacientes submetidos a procedimento cirúrgico. Atualmente, é coletada no intra-operatório uma única amostra do material para avaliação anatomopatológica. No presente estudo, essa amostra é dividida em duas partes iguais e encaminhada a segunda para a análise a fresco na Patologia Clínica. A análise comparativa, até o momento, apresenta correlação, entretanto alguns resultados positivos da anatomia patológica não foram observados na citologia oncótica. Entretanto, ainda não é possível apresentar a conclusão do estudo, dada a continuidade de coleta de novos resultados.

Neoplasias gástricas - Citologia - Líquido ascítico