



B0223

TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL

Driéllen Eusebio (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Maria Francisca Colella dos Santos (Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP

Introdução: O diagnóstico precoce da perda auditiva direciona o planejamento de medidas terapêuticas, objetivando a prevenção de agravos e melhoria da qualidade de vida da criança.

Objetivo: Analisar os resultados obtidos no programa de Triagem Auditiva Neonatal aplicado em lactentes que permaneceram em UTI Neonatal no CAISM-UNICAMP, correlacionando as condições de nascimento, intercorrências neonatais e os indicadores de risco para perda auditiva coletados a partir do relatório de alta do lactente. **Método:** A Triagem foi feita por meio do teste de Emissões Otoacústicas Transientes (EOA) e/ou Potencial Evocado Auditivo do Tronco Encefálico automático (PEATE-A), que são métodos que emitem a resposta Passou ou Falhou. Os dados foram coletados e digitalizados num banco de dados e analisados estatisticamente. **Resultados:** Foram analisados 194 lactentes, dos quais 152 (78,35%) Passaram e 42 (21,64%) Falharam no teste. Os indicadores de risco de maior ocorrência foram: Prematuridade, permanência em UTI por mais de 5 dias, uso de ventilação mecânica e uso de medicamentos ototóxicos. **Conclusão:** Diante desses resultados podemos observar que a maioria dos lactentes passaram na triagem, os que falharam foram encaminhados para diagnóstico.

Triagem auditiva - Triagem neonatal - Triagem auditiva UTI neonatal