



XVI congresso interno de iniciação científica

Ginásio Multidisciplinar da Unicamp  
24 a 25 de setembro de 2008



B0106

### **"NÃO RESPONDADORES IMUNOLÓGICOS" À TERAPIA ANTI-RETROVIRAL ALTAMENTE EFICAZ (HAART): AVALIAÇÃO DA TERAPÊUTICA E SEUS DESDOBRAMENTOS**

Roger Krüger de Lima (Bolsista PIBIC/CNPq), Thiago Ferreira de Souza e Prof. Dr. Francisco Hideo Aoki (Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida causada pelo vírus da imunodeficiência humana é um grande problema de saúde pública mundial. O tratamento consiste na uso de três agentes anti-retrovirais simultaneamente, caracterizando a "Terapia Antiretroviral Avançada Altamente Eficaz" (HAART), levando à queda da carga viral até níveis indetectáveis e um aumento de células T CD4. Porém alguns pacientes apresentam respostas paradoxais, como os "não-respondedores imunológicos", que caracterizam-se por: reduzirem a carga viral, porém não aumentam os níveis de CD4+. Procuramos avaliar as terapias e comorbidades desse grupo em nosso serviço através de um estudo retrospectivo, por meio de prontuários, analisando-os através do Epi Info. Foi visto que 54,7% só havia feito uso de 1 esquema HAART, 47% usavam AZT,3TC,EFZ na inclusão, 65,6% fez uso de 1 combinação até a resolução, 71% tiveram uma adesão regular ou boa, permanecendo por 24,4 meses em média neste estado. As doenças com maior incidência foram: Tuberculose 20%, toxoplasmose 22% e pneumonia 19%. Usando em média 3,9 medicamentos para outras comorbidades, sendo que 84,4% fez uso de medicação profilática. O estudo mostra boa adesão ao tratamento, longo tempo de recuperação, uso de várias medicações além da HAART e alta incidência de comorbidades.

HAART - HIV - Terapêutica