



XVI congresso interno de iniciação científica

Ginásio Multidisciplinar da Unicamp
24 a 25 de setembro de 2008



B0091

NEOPLASIAS CUTÂNEAS MALIGNAS DA ORELHA: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E HISTOPATOLÓGICAS

Patrícia Pavan (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Elemir Macedo de Souza (Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP

O trabalho é uma investigação sobre comportamento de carcinoma basocelular (CBC) localizado na orelha comparativamente ao CBC da face exceto nariz. Objetivos: analisar os subtipos de CBC em relação a CK 5/6, CK7, EMA, MH99, p53 e distribuição anatômica. Métodos: Foram examinados 127 CBC diagnosticados entre 1980 e 2006, sendo 72 no pavilhão auricular e 55 na face. Do total 50 eram agressivos (30 da orelha e 20 da face) e 77 não agressivos (42 da orelha e 35 da face). Os CBC foram imunizados com anti-CK 5/6, CK7, EMA, MH99 e p53 e analisados com base na divisão em quatro grupos: a) na face não agressivos; b) na face agressivos; c) na orelha não agressivos; d) na orelha agressivos. Resultados: Não houve diferenças significantes entre os quatro grupos para distribuição anatômica, expressão de p53 ou de H99. Já a expressão de CK5/6 foi significativamente menor nos subtipos agressivos da orelha que nos outros grupos. Conclusões: a perda da expressividade do CK5/6 nos CBC da orelha pode ser um marcador do comportamento biológico de maior agressividade. A razão exata de como e porque ocorre a perda deste marcador necessita de maiores estudos.

Carcinoma basocelular - Neoplasia - Pavilhão auricular