



XVI congresso interno de iniciação científica

Ginásio Multidisciplinar da Unicamp
24 a 25 de setembro de 2008



H0598

PREVALÊNCIA DA RETINOPATIA DIABÉTICA EM UM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO

Ana Maria Ribeiro da Fonseca (Bolsista FUNDAP) e Profa. Dra. Zélia Zilda Lourenço de Camargo Bittencourt (Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP

O presente estudo objetiva conhecer a prevalência de doenças desencadeadoras da perda visual em adultos, atendidos em um programa de reabilitação de deficientes visuais. No período de maio de 2004 a abril de 2008, foram realizados no CEPRE, 15 grupos de pacientes sendo 6 de cegos e 9 de baixa visão. O atendimento é realizado por equipe multidisciplinar composta por pedagogia, psicologia, terapeuta ocupacional, assistente social e A.V.D. Realizou-se coleta de dados nos prontuários dos usuários observando as variáveis: causa da deficiência, procedência, sexo, idade, escolaridade, estado civil, etc.. Dentre os 155 sujeitos atendidos pelo Programa de Reabilitação, observou-se alta prevalência de retinopatia diabética, apontada pela literatura como a maior causa de perda visual em adultos. Considerando que a retinopatia diabética adquirida é uma doença cuja prevenção passa pela observância de informações sobre a mesma, a debilidade educacional dos indivíduos representa um importante entrave à prevenção primária repercutindo diretamente na saúde ocular. A retinopatia diabética é um grave problema de saúde pública e quando abordada por equipe multidisciplinar sinaliza avanço para a prevenção do agravamento da doença e o conseqüente comprometimento da qualidade de vida.

Deficiência visual - Retinopatia diabética - Reabilitação