



XVI congresso interno de iniciação científica

Ginásio Multidisciplinar da Unicamp  
24 a 25 de setembro de 2008



B0192

### **AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE SEXUAL DE PACIENTES COM PROLAPSO GENITAL ANTES E APÓS TRATAMENTO CIRÚRGICO**

Jullyana Heinen Peixoto (Bolsista SAE/UNICAMP), Thaísa Andrade Ribeiro Marcondes Narciso, Rosane R. C. Thiel e Prof. Dr. Paulo Cesar Rodrigues Palma (Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP

O prolapso pélvico é um problema comum em mulheres de diferentes idades. O mesmo envolve alteração na sustentação de múltiplos locais na vagina, interferindo na função de intestino, uretra e/ou bexiga (levando a sintomas do trato urinário inferior, como a incontinência urinária) e na função sexual. A incidência da disfunção sexual após perineoplastia e/ou vários procedimentos transvaginais indicados para correção de prolapso (como a colpoptasia anterior/posterior) é amplamente discutida. Na literatura, encontra-se 19 estudos controlados, randomizados que relatam efeitos da cirurgia, como consequências em bexiga, intestino e função sexual, e fornecem recomendações baseadas em evidências. Essas recentes pesquisas formam a base de conhecimento atual para que seja possível uma boa prática clínica, focada na escolha do melhor tratamento para o problema, que na maioria das vezes envolve a cirurgia do assoalho pélvico. Por isso, considera-se importante avaliar a qualidade de vida e resposta sexual de mulheres atendidas nos ambulatórios de ginecologia do CAISM e de urologia do Hospital de Clínicas da UNICAMP e que são submetidas ao tratamento cirúrgico, sendo esse o objetivo deste trabalho; a avaliação usa como metodologia a aplicação de entrevistas, através de questionários divulgados pela literatura (WHOQOL e FSFI - Female Sexual Function Index), a todas as pacientes com atividade sexual e prolapso genital, antes e após a cirurgia, comparando-as para análise do tratamento cirúrgico.

Prolapso genital - WHOQOL - FSFI