



XVI congresso interno de iniciação científica

Ginásio Multidisciplinar da Unicamp  
24 a 25 de setembro de 2008



B0141

### **FENÔMENO DE RAYNAUD E MIGRÂNEA NO LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO**

Angela de Souza Cassol (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Lilian Tereza Lavras Costallat (Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP

O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica do tecido conjuntivo cuja etiologia permanece não totalmente esclarecida. O fenômeno de Raynaud é um distúrbio trifásico deflagrado por frio ou estresse emocional que resulta de uma exagerada vasoconstrição e vasoespasma de artérias e arteríolas digitais. Migrânea é uma condição crônica de recorrentes cefaléias de intensidade moderada a severa. Esta investigação pretende abordar a frequência e as características do aparecimento do fenômeno de Raynaud e de migrânea em pacientes portadores de LES. Para tal, avaliar-se-ão 60 mulheres lúpicas, com presença, ou não, de fenômeno de Raynaud e, a partir disso, analisar-se-á a prevalência de migrânea, seguindo critérios da Classificação Internacional das Cefaléias segunda edição. O instrumento utilizado para tal avaliação será a aplicação de entrevistas e análise laboratorial de anticorpos antifosfolípides. As variáveis serão analisadas por sua frequência, média e desvio padrão. As diferenças de frequências nos dois grupos estudados serão analisadas pelo teste Qui-Quadrado. Espera-se encontrar uma associação entre fenômeno de Raynaud e migrânea em pacientes lúpicos, dada à presença de anticorpos antifosfolípides.

Migrânea - Fenômeno Raynaud - Lúpus