



B0171

ANASTOMOSES ILEOCÓLICAS NA DOENÇA DE CROHN: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE TÉRMINO-TERMINAL E LÁTERO-LATERAL

Vitor Augusto de Andrade (Bolsista PIBIC/CNPq), Claudio Saddy Rodrigues Coy (Co-orientador) e Profa. Dra. Maria de Lourdes Setsuko Ayrizono (Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP

A doença de Crohn (DC) caracteriza-se por um processo inflamatório crônico, transmural, do trato gastrointestinal, que afeta preferencialmente a região ileocólica, podendo ser necessário, em algumas situações, tratamento operatório. O objetivo deste trabalho foi analisar, retrospectivamente, duas variantes de anastomoses, látero-lateral e término-terminal, em pacientes submetidos à ileotiflectomia, avaliando a recorrência sintomática, endoscópica e radiológica, assim como a necessidade de re-operações. Foram estudados 40 pacientes, com DC, do Ambulatório de Doenças Inflamatórias Intestinais do Gastrocentro-UNICAMP, operados no período de 1990 a 2009, sendo 14 da primeira variante (grupo 1) e 26 da segunda (grupo 2). Não houve diferenças quanto ao sexo, idade, grupo étnico, indicação cirúrgica, via de acesso e tempo de evolução da doença, entre os dois grupos. Foram observadas 3 complicações, sendo uma no grupo 1 e duas no grupo 2. No seguimento, as recidivas clínica, endoscópica e radiológica foram semelhantes entre os grupos. Já em relação às re-operações, não foi possível uma comparação estatística, pois ocorreram apenas no grupo 2. Desta forma, concluiu-se que os dois grupos foram similares quanto à recorrência da doença, e para a análise das re-operações, provavelmente, será necessário um tempo de seguimento maior.

Doença de Crohn - Anastomoses ileocólicas - Ileotiflectomia