



B0158

EXPRESSÃO DE RECEPTORES HORMONAIS E PREVALÊNCIA DE MALIGNIDADE EM PÓLIPOS ENDOMETRIAIS DE MULHERES NA PRÉ E PÓS-MENOPAUSA

Joyce Duarte Caseiro (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Lúcia Helena Simões da Costa Paiva (Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP

Os pólipos endometriais são achados frequentes em mulheres na peri e pós-menopausa, com potencial de malignidade ainda pouco conhecido. Fatores de risco para degeneração maligna dessas lesões tem sido descritas como a hipertensão arterial, estado menopausal e idade. Fatores hormonais também parecem estar envolvidos na patogênese, em especial o estrógeno e a progesterona, por seu efeito modulador da proliferação e diferenciação celulares. **Objetivo:** Avaliar a prevalência de malignidade e a expressão de receptores hormonais em pólipos endometriais malignos e benignos de mulheres na peri e pós-menopausa. **Sujeitos e Métodos:** Estudo de corte transversal a ser realizado em 1050 mulheres na peri e pós-menopausa submetidas à ressecção histeroscópica de pólipos endometriais no CAISM/UNICAMP no período de 1998 a 2008. **Resultados Parciais:** A média etária das mulheres foi de 58,1 anos ($DP \pm 10,5$) e 76,6% estavam na pós-menopausa ($N=627$). A maioria apresentava lesões endometriais benignas, sendo 71,1% pólipos endometriais e 14,5% pólipos com hiperplasia simples ou complexa. Pólipos com hiperplasias atípicas foram constatados em 1,1% e carcinoma endometrial em 2,4 % das pacientes. Imunohistoquímica e outras análises em execução.

Ólipos - Receptores Hormonais - Endométrio