



B0177

PREVALÊNCIA DE PERDA DE PESO EXCESSIVA EM RN EM ALOJAMENTO CONJUNTO E A ASSOCIAÇÃO COM FATORES NEONATAIS

Larissa Somera Alves (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Ianê Nogueira do Vale (Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP

Descrição: Aleitamento Materno (AM) é um processo complexo influenciado por muitos fatores. O processo fisiológico de produção de leite começa imediatamente após o nascimento, tornando-se abundante de 24 a 36 horas pós-parto, sendo o leite maduro após 72 horas. No entanto, existem situações em que este processo não ocorre de forma natural, podendo resultar em perda de peso excessiva para o recém-nascido (RN), hiperbilirrubinemia, reinternação, entre outros. **Objetivos:** Verificar a prevalência da perda de peso acima de 8% e 10% do peso de nascimento do RN e identificar possíveis fatores relacionados. **Método:** Estudo descritivo com 450 RN internados em Alojamento Conjunto (AC) de um hospital escola do interior do estado de SP. **Resultados:** Mães dos RN com idade média de 25,9 anos, maioria multipara, parto vaginal, unida e com ensino fundamental; metade exerce trabalho remunerado. Em relação ao RN, maioria a termo, adequado para idade gestacional. A prevalência de perda de peso acima de 10% foi de 6,4%, acima de 8% foi de 27,3%. O parto cesariano esteve associado à perda de peso maior de 10% e 8% e a equipe demonstrou perceber as dificuldades no estabelecimento da lactação. **Conclusões:** a equipe de saúde tem condições de identificar e intervir nas dificuldades iniciais do AM, prevenindo o desmame precoce.

Perda de peso - Amamentação - Recém-nascido saudável