



B0206

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DA ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS ENTRE OS MESES JANEIRO DE 2012 A ABRIL DE 2013

Lara Gusmão Vicente dos Anjos (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Marcondes Cavalcante França Junior (Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP

A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é a mais comum das doenças do neurônio motor em adultos, de curso progressivo e óbito inevitável. No Brasil, a literatura epidemiológica da ELA é escassa. Diante disso, foi feito um levantamento dos casos de ELA nos 2 hospitais terciários neurológicos de Campinas (HC-UNICAMP e Hospital Celso Pierro-PUCC) com o objetivo de traçar perfil epidemiológico da ELA no município. Foram levantados todos os pacientes com diagnóstico de ELA segundo critérios El Escorial nos ambulatórios dos 2 hospitais no período de janeiro de 2012 a abril de 2013. Foram identificados 68 pacientes, sendo 26 de Campinas (38,24%), com idade média de 56,76 anos, idade de início da doença média de 54 anos e predomínio de homens (65%). Dos 26, 6 desenvolveram a doença ao longo desse período e 1 faleceu. Sendo a estimativa populacional de Campinas (Censo IBGE 2010) de 1,08 milhão de habitantes, os dados sugerem prevalência de 2,3 casos/ 100.000 habitantes e incidência de 0,5 novos casos/ano por 100.000 habitantes. Os valores são provavelmente subestimados, porém revelaram valores abaixo das estimativas médias esperadas para incidência e prevalência de ELA na literatura, reforçando a necessidade de estudos de epidemiologia em ELA para melhor entendimento de sua distribuição no país.

Epidemiologia - Esclerose lateral amiotrófica - Neurologia