



B0270

CORRELAÇÃO ENTRE PERFIL NUTRICIONAL PRÉ-OPERATÓRIO E AS COMPLICAÇÕES INTRA E PÓS-OPERATÓRIAS EM MULHERES COM CÂNCER GINECOLÓGICO E MAMÁRIO

Natália Miatelo Gimenez (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Rosa Inês Costa Pereira (Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP

As alterações nutricionais associam-se a um aumento de morbidade em pacientes oncológicos cirúrgicos, prolongam o tempo de hospitalização e ocasionam maior necessidade de UTI. Com o objetivo de correlacionar o perfil nutricional pré-operatório com a ocorrência de complicações intra e pós-operatórias em mulheres com câncer ginecológico e de mama, tratadas no Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher - Caism/Unicamp, realizou-se um estudo de coorte retrospectiva com 190 pacientes submetidas a tratamento cirúrgico dessas neoplasias, entre 06/08/2003 e 26/04/2005. No pré-operatório, o perfil nutricional foi avaliado pelo Índice de Massa Corpórea (Kg/m^2) e pela Avaliação Nutricional Subjetiva Global. Dados demográficos: idade média = 53.48 anos, \pm 13.9; tipo de câncer mais prevalente: mama (61.6%), seguido do câncer de colo (24.2%). Quanto ao estado físico, a distribuição foi: ASA 1 (18.3%), ASA 2 (65.1%) e ASA 3 (16.6%); estado nutricional pela ANSG: eutróficas = 75.3% e desnutridas = 24.7%; segundo o IMC: obesidade ($\text{IMC} \geq 30$) = 22.1% e $\text{IMC} < 30$ = 77.9%. Houve correlação positiva entre tempo de internação ($p=0.002$) e necessidade de UTI ($p=0.02$) com o estado físico, mas não houve correlação entre os mesmos parâmetros e o estado nutricional determinado pela ANSG ($p=0.47$), ou IMC ($p=0.33$). Como grandes alterações nutricionais agravam o estado físico, estas devem ser consideradas na avaliação pré-operatória.

Câncer - Perfil nutricional - Complicações