



B0243

DIAGNÓSTICO DE DPOC EM PACIENTES COM DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA

Talita Lima Ribeiro (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Mônica Corso Pereira (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP

O subdiagnóstico da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é frequente. O tabagismo é um fator de risco comum para DPOC e para doenças arteriais coronarianas (DAC). **Objetivos:** Avaliar a frequência de tabagismo, sintomas respiratórios, conhecimento de diagnóstico prévio de DPOC, alterações funcionais respiratórias e perfil lipídico em doentes com DAC acompanhados no setor de cardiologia de um hospital universitário. **Métodos:** Trabalho de coorte transversal com pacientes oriundos do ambulatório de DAC. Foram coletados dados clínicos (idade, gênero, sintomas, hábito tabágico, diagnóstico prévio de DPOC), ecocardiográficos, funcionais (espirometria sem/com broncodilatador, Saturação de Oxigênio), perfil lipídico. **Resultados:** Avaliados 71 pacientes: idade média: 62 anos; 37% mulheres/63% homens; 30% nunca fumaram, 13% tabagistas ativos, 58% ex-tabagistas; 31% referiram tosse, 27% sibilância, 38% dispneia; 22,5% sabiam ser portadores de alguma doença pulmonar. Feitas 26 espirometrias: 8(30,8%) com alterações, 2(7,8%) com DPOC Gold II, 6(23%) com distúrbio ventilatório restritivo. Das 8 alteradas, apenas um sabia ser portador de alguma doença pulmonar. **Conclusão:** buscar ativamente o diagnóstico de DPOC pode ajudar a aumentar o diagnóstico de DPOC em estádios mais precoces.

DPOC - Doença arterial coronariana - Diagnóstico de DPOC