



B0388

AVALIAÇÃO CEFALOMÉTRICA DO ÂNGULO NASOLABIAL EM PACIENTES COM OS DIFERENTES TIPOS DE DEGLUTIÇÃO ATÍPICA

Pablo Alberto Andrade Vieira (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Maria Beatriz Borges de Araújo Magnani (Orientadora), Faculdade de Odontologia - FOP, UNICAMP

A análise do perfil facial torna-se cada vez mais importante no diagnóstico e no plano de tratamento, no qual o ângulo nasolabial apresenta-se como importante estrutura da estética facial, detendo as maiores discussões sobre as suas formas, variações e modificações. A presente pesquisa foi avaliar comparativamente as médias do ângulo nasolabial de pacientes com oclusão normal e pacientes com os diferentes tipos de deglutição atípica, que é definido pela posição da língua na cavidade bucal, podendo ser baixa, média ou alta. A amostra para a realização da pesquisa foi composta de 60 telerradiografias em normal lateral da cabeça, assim distribuídos: 20 pacientes com posicionamento lingual baixo, 20 com posicionamento lingual médio e 20 pacientes com posicionamento lingual alto, na faixa etária dos 6 as 10 anos de idade. Até o presente momento, foram traçados estruturas esqueléticas, dentárias e tegumentares de interesse, e também foi mensurado o ângulo nasolabial que é o ângulo formado pela borda inferior do nariz e o filtro labial de todas telerradiografias. Para os resultados e conclusão falta a análise comparativa dos valores normais com os valores encontrados na pesquisa.

Deglutição atípica - Cefalometria - Ângulo nasolabial